



Olive (*Olea europaea* L.) leaf extract prevents motor deficit in streptozotocin-induced diabetic rats

Saeed Esmaeli-Mahani*, Ayat Kaeidi

Dept. Biology, Faculty of Sciences, Shahid Bahonar University of Kerman, Iran

Received: 29 Apr 2012

Accepted: 20 June 2012

Abstract

Introduction: Olive leaves have been recommended in the scientific literature and traditional medicine as a cure for the treatment of diabetes and this plant has powerful antioxidants and neuroprotective effects. Here, we studied the possible effects of olive leaf extract (OLE) on motor deficits in diabetic neuropathy.

Methods: The rotarod treadmill test was used to access motor coordination in streptozotocin-induced diabetic rats. Different doses of OLE (100, 300 and 500 mg/kg, i.g.) were given. Serum glucose and insulin levels were assessed by specific kits.

Results: Four weeks after diabetes induction, glucose level was significantly decreased and insulin concentration increased ($P<0.001$). The rotarod treadmill test showed a marked impairment of the motor coordination of the diabetic animals ($P<0.001$). The retention time of the diabetic animals was reduced by 61.2% compared to the control animals, whereas treatment with 300 mg/kg OLE increased retention time to 83.6% of the control values. That dose had a moderate lowering effect on serum glucose with no effect on insulin levels.

Conclusion: The results suggest that olive leaf extract has protective effects against high glucose-induced motor defects in diabetic rats.

Key words: Olive leaf extract, Diabetes, Motor deficits, Rats

* Corresponding author e-mail: semahani@yahoo.com
Available online at: www.phypha.ir/ppj



عصاره برگ زیتون از بروز اختلالات حرکتی در موش‌های صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین جلوگیری می‌کند

سعید اسماعیلی ماهانی^{*}، آیت کائیدی

بخش زیست‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان

پذیرش: ۳۱ خرداد ۹۱

دریافت: ۱۰ اردیبهشت ۹۱

چکیده

مقدمه: در متون علمی و طب سنتی از برگ‌های درخت زیتون به عنوان درمانی برای دیابت ذکر شده است و این گیاه دارای ترکیبات آنتی‌اکسیدانی قوی بوده و خاصیت محافظت کننده نورونی نیز دارد. در این مطالعه قصد داریم تا اثر احتمالی عصاره برگ زیتون را در جلوگیری از بروز نقایص حرکتی ناشی از نوروپاتی دیابتی را مورد بررسی قرار دهیم.

روش‌ها: در این مطالعه از تست راه پیمایی بر روی میله چرخان برای بررسی هماهنگی حرکتی در موش‌های دیابتی شده بوسیله استرپتوزوتوسین استفاده شد. موش‌های دیابتی به مدت سه هفته دوزهای ۱۰۰، ۳۰۰ و ۵۰۰ میلی گرم بر کیلوگرم عصاره برگ زیتون را به صورت خوارکی دریافت کردند. سطوح سرمی قند و انسولین با کیت‌های مربوطه سنجیده شد.

یافته‌ها: چهار هفته بعد از القای دیابت سطح سرمی گلوکز و انسولین به ترتیب افزایش و کاهش قابل ملاحظه‌ای را نشان دادند ($P < 0.001$). نتایج تست راه‌پیمایی بر روی میله چرخان نشان داد که موش‌های دیابتی دچار نقص عمده در هماهنگی حرکتی خود شدند ($P < 0.001$). مدت زمان راه‌پیمایی حیوانات دیابتی به $61/2$ درصد حیوانات سالم کاهش یافت در حالیکه موش‌های دیابتی که دوز 300 mg/kg عصاره را دریافت کرده بودند این مدت زمان به $83/6$ درصد حیوانات سالم رسید. این دوز از عصاره سبب کاهش مختصراً در میزان قند خون حیوانات دیابتی شد ولی بر میزان انسولین سرم تأثیری نداشت.

نتیجه گیری: نتایج این مطالعه پیشنهاد می‌کند که عصاره برگ زیتون می‌تواند نقش محافظت کننده در بروز نقایص و ناهماهنگی‌های حرکتی ناشی از دیابت در موش صحرایی داشته باشد.

واژه‌های کلیدی: عصاره برگ زیتون، دیابت، اختلال حرکتی، موش صحرایی

مقدمه

شواهد زیادی نشان می‌دهند که حتی مراحل اولیه ابتلا به دیابت نیز با بعضی انواع نوروپاتی همراه می‌باشد [۲]. چندین علت برای انواع سندروم‌های نوروپاتیک در بیماران دیابتی شناسایی شده است. هایپرگلایسمی به عنوان عنصر اصلی پیدایش و پیشرفت نوروپاتی دیابتی بوده و عوارض عروق ریز و مویرگی نیز در آن دخیل می‌باشند [۵]. شواهد زیادی نشان می‌دهند که محیط هایپرگلایسمیک باعث خون رسانی ناقص متابولیکی میتوکندری‌های این اعصاب و استرس اکسیداتیو در

نوروپاتی یک عارضه شایع و زیان آور هم در دیابت نوع یک و هم نوع دو می‌باشد. شیوع نوروپاتی در بیمارانی که به تازگی به دیابت مبتلا شده‌اند ۸ درصد و در کسانی که به مدت طولانی به این بیماری مبتلا بوده‌اند تا ۵۰ درصد می‌باشد.

semahani@yahoo.com
www.phypha.ir/ppj

* نویسنده مسئول مکاتبات:
وبگاه مجله:

ناشی از القاء دیابت تحریبی در موش‌های بزرگ آزمایشگاهی مورد بررسی قرار دهیم.

مواد و روش‌ها

حیوان‌ها: در این تحقیق از موش‌های صحرایی نر نژاد ویستار در محدوده وزنی ۲۰۰ الی ۲۵۰ گرم استفاده شد. حیوان‌ها از حیوانخانه مرکز تحقیقات علوم اعصاب دانشگاه علوم پزشکی کرمان تهیه شدند. حیوان‌ها دسترسی آزاد به آب و غذا داشتند و به صورت گروه‌های ۴ تایی در قفسه‌های مجزا نگهداری شدند. مدت زمان ۱۲ ساعت تاریکی، ۱۲ ساعت روشنایی و دمای هوای ۲۵ درجه در محل نگهداری حیوان‌ها رعایت شد. ۵ روز قبل از شروع آزمایشات حیوان‌ها به خوبی دست‌آموز شدند تا به هنگام انجام تست مورد نظر، استرس در آنها بوجود نیاید. پروتکل تحقیقاتی مورد تأیید کمیته اخلاق مرکز تحقیقات علوم اعصاب (EC/KNRC/89-27) قرار گرفت.

تهیه عصاره برگ زیتون: برگ‌های زیتون (*Olea europaea* زیرگونه *europaea* *Sevillano*) از باغچه‌های تحقیقاتی کشت شده در شهرستان خرم‌آباد استان لرستان جمع آوری شدند. برگ‌ها از سرشاخه‌های سالم و بدون آسیب‌دیدگی چیده شدند. عصاره اتانولی برگ زیتون در مرکز تحقیقات گیاهان دارویی رازی لرستان تهیه شد. ابتدا برگ‌های زیتون در هوا خشک شدند. ۲۰۰ گرم از برگ‌های خشک شده توسط آسیاب به ذرات پودری تبدیل شدند. پودر تهیه شده دو مرتبه به وسیله اتانول ۸۰٪ عصاره گیری شد؛ سپس الكل حاوی عصاره فیلتر شده و مایع فیلتر شده به وسیله دستگاه خشک کن (با کاهش فشار و استوانه چرخان) آب‌گیری شد. عصاره اتانولی باقی مانده به صورت خشک فریز شد. جهت استفاده در آزمایشات هر بار مقدار مورد نظر عصاره وزن و در سرم فیزیولوژیک حل شد.^[۸]

القای دیابت در حیوان‌ها: دیابت به وسیله تزریق دوز ۵۵ mg/kg استرپتو佐توسین (STZ) حل شده در سیترات بافر ۰.۰۱ mol/L به صورت داخل صفاقی انجام گرفت. جهت اطمینان از دیابتی شدن حیوان‌ها، قند سرمی آن‌ها یک هفته پس از تزریق STZ اندازه گیری شد. قند خون بالای mg/dl

آن‌ها می‌شود^[۱۹]. استرس اکسیدانتیو منجر به آسیب میتوکندریایی و به تبع آن تحلیل رفتن آکسون نورون‌ها می‌شود^[۱۶]. در شرایط هیپرگلایسمیک تولید مقادیر زیاد گونه‌های باز فعال اکسیژن (ROS) و گونه‌های باز فعال نیتروژن (RNS)، سرانجام از ظرفیت آنتی اکسیدانی طبیعی سلول فراتر رفته و در نتیجه لیپیدها، پروتئین‌ها و DNA سلولی را دچار آسیب و حتی آپوپتوز می‌کند. این آسیب‌ها دست آخر عملکرد طبیعی و هماهنگی سلولی را به هم می‌ریزند^[۳]. مشخص گردیده است که بیماران دیابتی دچار نوروپاتی دارای علائمی مانند درد، بی‌حسی، گزگز کردن انگشتان، از دست دادن حس و تخریب نورون‌های حرکتی می‌باشند^[۵]. علاوه بر اینها بیماران دچار ضعف عضلانی در دست‌ها و پاها می‌شوند و حتی بسته به اینکه کدامیک از ریشه‌های عصبی در گیر شوند می‌توان اختلالات حسی و حرکتی را در عضلات قفسه سینه و صورت نیز مشاهده کرد. تا به امروز استراتژی‌های درمانی جهت جلوگیری از بروز عوارض دیابت منجمله نوروپاتی‌های حسی و حرکتی و درمان آنها ناکارامد می‌باشد.

درخت زیتون (*Olea europaea*, *Oleaceae*), نmad سنتی شروط، وفور نعمت، شادمانی و صلح می‌باشد. میوه درخت زیتون و برگ‌های آن دارای سابقه تاریخی درمانی، تعذیبه‌ای و تشریفاتی می‌باشند^[۲۴]. اثرات درمانی برگ زیتون در زمینه‌های مختلف روز به روز برای دانشمندان بیشتر اثبات می‌شود. در مطالعات گوناگونی اثرات آنتی اکسیدانی، هیپرگلایسمیک، ضد فشارخون، ضد آرترو اسکلروز و ضد میکروبی برگ زیتون گزارش شده است^[۷]. اخیراً نیز مشخص شده است که عصاره برگ زیتون نقش محافظتی در ایسکمی مغزی داشته^[۱۸] و خاصیت ضد دردی نیز دارد^[۸]. همچنین در مطالعات انجام شده انسانی اثرات محافظت نورونی عصاره برگ زیتون در بیماری MS و دیگر ناهنجاری‌های نورونی دیده شده است^[۲۰]. عصاره اتانولی برگ زیتون مدت زمان شروع مرحله یک تشنج ناشی از پتیلن تترازول را به تأخیر می‌اندازد^[۲۵]. مطالعه قبلی ما نشان داد که عصاره برگ این گیاه از آسیب سلولی ناشی از قند بالا در سلولهای شبه نورونی PC12 جلوگیری می‌کند و از شدت دردهای نوروپاتیک و بروز اختلالات حسی در موش‌های دیابتی می‌کاهد^[۱۴]. در این مطالعه قصد داریم تا اثر عصاره برگ زیتون را در کاهش بروز نقايسص حرکتی

میزان انسولین سرم در گروه های آزمایشی با روش کمی لومینسانس ایمیونواسی (CLIA) اندازه گیری شد [۱۳]. حساسیت سنجش $\mu\text{IU}/\text{ml}$ ۲ بوده و 50 میکرولیتر سرم استفاده شد. رفرنس های پایه انسولین در این سنجش از صفر تا 200 میکرو واحد در میلی لیتر بودند. میکروپلیت ها با آنتی بادی مونوکلونال انسولین پوشیده شده بودند. بعد از اضافه کردن نمونه ها، آنتی بادی دوم و شستشو حدود 100 میکرولیتر محلول کمی لومینسانس اضافه می شد و بعد از ۵ دقیقه نمونه ها توسط دستگاه خوانش گر کمی لومینسانس خوانده می شدند.

بررسی هماهنگی حرکتی: جهت بررسی هماهنگی حرکتی حیوان های مورد آزمایش، از تست راهپیمایی بر روی میله چرخان استفاده شد [۴]. طی دوره تحقیق، دو مرتبه حیوان ها روی میله ی چرخان دستگاه قرار گرفتند. یک مرتبه قبل از شروع آزمایش و یک مرتبه هم پس از چهار هفته (روز آخر آزمایش). بعد از اینکه حیوان ها توانستند خود را روی میله چرخان نگه دارند دستگاه به مدت سه دقیقه روشن شد. مدت زمانی که حیوان می توانست خود را روی میله چرخان نگه دارد (که شاخصی از هماهنگی حرکتی آن ها می باشد) ثبت گردید.

آنالیز آماری: نتایج به صورت میانگین $\pm \text{SEM}$ ارائه شدند. میانگین داده ها در گروه های مختلف آزمایشی به کمک آزمون یک طرفه ANOVA و به دنبال آن آزمون Tukey تجزیه و تحلیل شد. $P < 0.05$ به عنوان حداقل سطح معنی داری در نظر گرفته شد.

یافته ها

اثر عصاره برگ زیتون بر سطح گلوکز سرم و وزن موش های صحرایی دیابتی:

در پایان آزمایشات یعنی هفته چهارم پس از تزریق STZ در پاره های دیابتی داشتند. میزان گلوکز سرم را میتوان با غلظت گلوکز سرم رت های دیابتی می سازند. $40.4 \pm 3.3 \text{ mg/dl}$ و $19.3 \pm 3.8 \text{ mg/dl}$ بود که به طور معنی داری نسبت به حیوان های کنترل (P < 0.001) افزایش یافته بود. غلظت گلوکز سرم حیوان های دیابتی شده که حلال دریافت کرده بودند معادل با غلظت سرم حیوان های دیابتی بود. حیوان های دیابتی که به مدت ۳ هفته (هر روزه) دوز 300 mg/kg عصاره برگ زیتون دریافت کرده بودند، غلظت گلوکز سرم شان نسبت

۳۵۰، به عنوان شاخص دیابتی شدن در نظر گرفته شد [۱۲]. **تیمار حیوان های دیابتی با عصاره برگ زیتون:** با توجه به وزن حیوان ها، عصاره (بر حسب میلی گرم بر کیلو گرم وزن حیوان) از طریق لوله دهانی - معدی در دوز های 100 ، 300 و 500 میلی گرم بر کیلو گرم وزن حیوان، یک هفته پس از القاء دیابت و هر روزه، به مدت ۳ هفته به حیوان ها خورانیده شد. موشهای صحرایی در گروه های 6 تا 8 تائی به صورت زیر دسته بندی شدند:

گروه کنترل: حیوان های سالم و بدون هیچ گونه درمان با عصاره برگ زیتون.

گروه دیابت: حیوان های دیابتی بدون هیچ گونه درمان با عصاره برگ زیتون.


گروه دیابت که حلال عصاره برگ زیتون (سالین) را به مدت سه هفته دریافت می کردند.

گروه دیابت و عصاره که دوز های ذکر شده را به مدت ۳ هفته دریافت می کردند.


گروه دیابتی کنترل مثبت که انسولین را در دوز 4 واحد بر کیلو گرم روزانه به مدت ۳ هفته دریافت می کردند.

سنجدخان انسولین و قند خون: چهار هفته بعد از تجویز STZ رت ها تحت بیهوشی با گاز CO_2 کشته شده و سرم خون آنها جدا و تا زمان سنجش در فریزر و در دمای منهای بیست درجه سانتی گراد نگهداری شد. غلظت گلوکز سرم بصورت آنزیمی [۲۳] و با استفاده از کیت پراکسیداز- اکسیداز گلوکز (GOD-POD kit, Pars Azmoon Co., Iran) سنجیده شد. اساس این روش اکسیداسیون گلوکز توسط گلوکز اکسیداز (GOD) می باشد که تولید H_2O_2 و اسید گلوکونیک می کند و در نهایت می شود. 100 میکرولیتر از محلول پراکسیداز (POD) سنجیده می شود. میزان رنگ تولید شده در طول موج 37 درجه انکوبه می شد. میزان رنگ تولید شده در طول موج 540 نانومتر توسط اسپکترو فوتومتر در مقابل محلول بلانک خوانده می شد. محلول بلانک بجای سرم مخلوط شده و در دمای 37 درجه انکوبه می شد. غلظت گلوکز سرم بر اساس معادله Beer-Lambert محاسبه می شد که در آن $\text{As} = \text{AT} / (\text{AS} \times \text{CS}) (100 \text{ mg}/100 \text{ ml})$ نمونه ها و Cs غلظت استاندارد می باشد.

$$[\text{CG} (\text{mg/ml}) = \text{AT} / (\text{AS} \times \text{CS}) (100 \text{ mg}/100 \text{ ml})]$$




شکل ۱- تأثیر عصاره برگ زیتون بر میزان گلوکز سرم در حیوان‌های دیابتی. مقادیر به صورت mean \pm SEM نشان داده شده‌اند ($n=6-8$). ***: اختلاف معنی داری در مقایسه با گروه کنترل (Cont) و همینطور نسبت به گروه دیابتی دریافت کننده انسولین (Diab+Ins). P<0.001. +: اختلاف معنی داری در مقایسه با سطح گلوکز سرم در مقایسه با گروه دیابتی (Diab) و همینطور دیابتی که حلال (Diab+Veh) دریافت کرده بود.




شکل ۲- تأثیر عصاره برگ زیتون بر میزان وزن حیوان‌های دیابتی شده. مقادیر به صورت mean \pm SEM نشان داده شده‌اند ($n=6-8$). ***: اختلاف معنی داری در مقایسه با گروه کنترل (Cont). +: اختلاف معنی داری در مقایسه با وزن حیوانات گروه دیابتی (Diab).

نداشت (شکل شماره ۱).
شکل شماره ۲ نشان دهنده وزن حیوان‌های گروه‌های کنترل، دیابتی و دیابت درمان شده با عصاره در هفته چهارم بعد از تزریق STZ می‌باشد. همانگونه که در شکل نشان داده شده

به مقدار آن در گروه دیابتی کاهش نشان داد (P<0.05). هرچند در حیوان‌های دیابتی که دوز mg/kg ۱۰۰ و ۵۰۰ عصاره برگ زیتون را دریافت کرده بودند غلظت گلوکز سرم نسبت به حیوان‌های دیابتی (بدون درمان با عصاره) تغییری



شکل ۳- تأثیر عصاره برگ زیتون بر نقایص حرکتی ایجاد شده در حیوان‌های دیابتی. مقادیر به صورت mean \pm SEM نشان داده شده‌اند (n=6-8). ***: اختلاف معنی داری نسبت به گروه کنترل (Cont) و همینطور نسبت به گروه دیابتی دریافت کننده انسولین (Diab+Ins) (P<0.001). +: اختلاف معنی داری در مقایسه با گروه دیابتی (Diab) و همینطور دیابتی که حال (Diab+Veh) دریافت کرده بود.



شکل ۴- تأثیر عصاره برگ زیتون بر سطوح انسولین سرم در حیوان‌های دیابتی. مقادیر به صورت mean \pm SEM نشان داده شده‌اند (n=6-8). ***: اختلاف معنی داری در مقایسه با گروه کنترل.

(Diab+300E) نسبت به وزن حیوان‌های گروه دیابت (Diab) در میزان بالاتری قرار دارد (شکل شماره ۲). نقایص حرکتی القاء شده توسط دیابت و اثر عصاره برگ زیتون بر آن: تست راهپیمائی بر روی میله

است وزن حیوان‌های گروه دیابت و گروه دیابت + حلال و دوزهای مختلف عصاره طور معنی داری نسبت به گروه کنترل کمتر می‌باشد (P<0.001). از طرفی وزن حیوان‌های گروه دیابت + دوز ۳۰۰ میلی گرم بر کیلوگرم عصاره

قند خون بعد از صرف غذا در موش‌های دیابتی می‌باشدند. این گروه همچنین اثر عصاره برگ زیتون بر پاسخ‌های گلایسمیک افراد تغذیه شده با برنج پخته شده را مطالعه کردند. آنان افراد را به دو گروه بر اساس قند خون قبل از غذا خوردن (نرمال و در خط مرز دیابت) تقسیم کردند. بعد از خورانیده شدن برنج پخته شده به همراه عصاره برگ زیتون، میزان افزایش گلوکز خون گروه خط مرزی نسبت به گروه کنترل به طور معنی داری کاهش یافته بود [۱۵]. در مطالعه دیگری گزارش شده است عصاره برگ زیتون، مقدار گلوکز سرمی موش‌های تغذیه شده با جیره غذایی پرچرب را کاهش می‌دهد. همچنین میزان تحمل به گلوکز نیز در این موش‌ها افزایش یافته بود [۲۱].

در مطالعه‌ای دیگر که به مقایسه اثر پایین آورندگی قند خون عصاره برگ زیتون و داروی گلی‌بنکلامید پرداخته بود، نشان داده شد تجویز روزانه عصاره برگ زیتون با دوز $g/5$ به موش‌های دیابتی شده به وسیله STZ، نسبت به گروه دیابتی درمان شده با گلی‌بنکلامید، باعث می‌شود گلوکز سرم کاهش بیشتری پیدا کند. همچنین میزان انسولین سرم نیز در گروه دیابتی درمان شده با عصاره برگ زیتون شده با گلی‌بنکلامید به مقدار طبیعی خود نزدیک‌تر بوده است. طی دوره این آزمایش، رت‌های طبیعی که عصاره دریافت کرده بودند هیچ‌گونه تغییر معنا داری در مقدار گلوکز و انسولین سرم از خود نشان ندادند [۶]. علاوه بر تحقیقات انجام شده روی خواص کاهندگی قند خون عصاره برگ زیتون، برخی از ترکیبات پلی‌فلنی موجود در آن نیز به صورت جداگانه مورد بررسی قرار گرفته‌اند. از آن جمله می‌توان به ترکیب اولئوروپین اشاره کرد که عمدت‌ترین پلی‌فلنل موجود در عصاره برگ زیتون می‌باشد. در این باره Al-Azzawie و Alhamdani گزارش کردند میزان قند خون خرگوش‌های دیابتی شده که به مدت هشت هفته با اولئوروپین تیمار شده بودند، نسبت به گروه دیابتی درمان نشده به طور معنی داری کاهش یافت [۱].

مکانسیمی که برای توجیه اثر کاهندگی قند خون به وسیله عصاره می‌توان پیشنهاد کرد تحریک افزایش باز جذب گلوکز در بافت‌ها می‌باشد. گزارش شده است که اولئوروپین (ترکیب اصلی عصاره برگ زیتون) موجب تحریک افزایش باز جذب گلوکز در بافت‌های محیطی می‌شود [۱۱]. با توجه به این که علت اصلی مشکلات به وجود آمده در دیابت و بیوژن نوروپاتی

چرخان برای بررسی هماهنگی حرکتی حیوان‌های دیابتی انجام شد (شکل ۳). حیوان‌های دیابتی دچار نقصان معنی داری در نگهداری خود بر روی میله چرخان در طول زمان شدند ($P<0.001$) به طوری که در حیوان‌های دیابتی توانایی نگه داشتن خود بر روی میله چرخان به طور قابل ملاحظه‌ای در مقایسه با حیوان‌های کنترل کاهش یافت ($P<0.01$). حیوان‌های گروه دیابت + دوز 300 mg/kg عصاره میزان $83/6$ درصد نسبت به گروه کنترل خود را بر روی میله چرخان نگه داری کنند ($P<0.05$). عصاره برگ زیتون با دوز 100 mg/kg تأثیر معنی داری بر نتایج حرکتی القاء شده توسط دیابت نداشت و حیوان‌های این گروه علائمی شبیه گروه دیابت از خود نشان دادند.

اثر عصاره برگ زیتون بر سطح انسولین سرم در موش‌های صحراوی دیابتی: در پایان آزمایشات غلظت انسولین سرم در گروه‌های آزمایشی نشان داد که در رت‌های دیابتی (Diab) سطح انسولین به طور معنی داری نسبت به گروه کنترل کاهش یافته بود. تجویز دوزهای مختلف عصاره برگ زیتون اثری بر سطح کاهش یافته انسولین نداشت (شکل شماره ۴).

بحث

اثر عصاره برگ زیتون بر گلوکز سرم حیوان‌های دیابتی:

همانگونه که در بخش نتایج این تحقیق نشان داده شد، غلظت گلوکز سرمی حیوان‌های دیابتی که به مدت ۳ هفته (هر روز) با دوز 300 mg/kg عصاره برگ زیتون دریافت کرده بودند، نسبت به میزان آن در آغاز دوره آزمایش کاهش یافته بود. این یافته با بسیاری از گزارشات قبلی در زمینه اثر کاهش دهنده قند خون توسط عصاره برگ زیتون یا ترکیبات تشکیل دهنده آن سازگاری دارد [۷]. از طرفی عصاره هیچ اثری بر سطح کاهش یافته انسولین در حیوانات دیابتی نداشت. در این زمینه Komaki و همکاران تأثیر عصاره برگ زیتون بر مقدار گلوکز خون رت‌های دیابتی شده بعد از مصرف غذا را نشان دادند. آنان پیشنهاد کردند که ترکیبات لوئسولین و اولئانولیک اسید موجود در عصاره، دارای اثر مهاری بر افزایش

عوارض دیابت و محیط هیپرگلایسمیک که منجر به آپوپتوز نورونی می‌گردد، ورود زیاد کلسیم به نورون‌ها از طریق کانال‌های کلسیمی نوع L می‌باشد [۱۶]. بنابراین می‌توان با جلوگیری از ورود زیاد کلسیم از طریق این نوع کانال‌ها به سلول‌های نورونی از مرگ آنها جلوگیری کرد. Scheffler و همکارانش با استفاده از آزمایشات ولتاژ کلمپ نشان دادند که عصاره برگ زیتون به عنوان یک آنتاگونیست کانال کلسیمی نوع L عمل می‌کند و به طور کامل مانع عمل کانال کلسیمی نوع L می‌شود [۲۱]. علاوه بر این Gilani و همکاران نیز نشان دادند که عصاره برگ زیتون دارای خواص مهار کننده کانال‌های کلسیمی می‌باشد [۹]. لذا می‌توان انتظار داشت که عصاره برگ زیتون با داشتن خواص آنتی اکسیدانی، کاهنده قند خون، ضد آپوپوتیک و بلوکری کانال‌های کلسیمی توانایی حفظ سلول را در برابر آسیب ناشی از گلوکز بالا را داشته باشد و به این طریق نیز از بروز نوروپاتی دیابتی و نقایص اعصاب حرکتی ناشی از آن جلوگیری می‌کند.

عصاره برگ زیتون نقش موثری در کاهش بروز نوروپاتی دیابتی و نقایص اعصاب حرکتی ناشی از دیابت دارد و خواص کاهنده قند خون، آنتی اکسیدانی، ضد آپوپتوزی و بلوکری کانال‌های کلسیمی آن می‌تواند حداقل جزئی از مکانیسم‌های محافظت کننده نورونی این عصاره باشد.

سپاسگزاری

این مطالعه با حمایت مالی مرکز تحقیقات گیاهان دارویی رازی لرستان و مرکز تحقیقات علوم اعصاب کرمان و در قالب بخشی از پایان نامه کارشناسی ارشد آقای آیت کاچیدی انجام شده است.

دیابتی، قند خون بالا می‌باشد، پس می‌توان این گونه نتیجه گرفت که عصاره برگ زیتون با کاهش نسبی قند خون در حیوان‌های دیابتی از مشکلات پیش آمده به وسیله گلوکز زیاد جلوگیری می‌کند. اما این همه ماجرا نیست، زیرا که این اثر عصاره کامل نیست و قند خون به حالت طبیعی خود برگشته است. از دیگر علل بروز نوروپاتی و نقایص حرکتی ناشی از آن، افزایش بیان ژن‌های التهابی و بروز التهاب در اعصاب حسی و حرکتی می‌باشد.

گزارش شده است که ترکیب اصلی و گلیکوزیدی اوکلوروپین (فراواترین پلی فنول موجود در برگ زیتون) عصاره برگ زیتون توانایی کاهش بیان عوامل التهابی IL-1B، TNF- α و COX-2 را داشته است [۱۰]. این عوامل در بروز التهاب نورونی و به تبع آن نقایص حرکتی دخیل می‌باشند. همچنین عوامل اکسیدان مانند NOS و ROS در شرایط هیپرگلایسمی و افزایش متابولیسم سلولی افزایش می‌یابند. این فرایند باعث بروز آسیب به DNA و سایر پروتئین‌های حیاتی سلول می‌شوند که در نهایت آغاز گرفتاری آپوپتوز و مرگ سلولی می‌شوند. مشخص شده است که مرگ نورونی و آپوپتوز عصبی نیز از عوامل بوجود آورنده نوروپاتی حرکتی دیابتی می‌باشد [۱۴، ۱۳] و عصاره موجود سبب مهار آپوپتوز در سلول‌های هیپرگلایسمیک و همینطور در نخاع حیوانات دیابتی می‌شود [۱۴]. ترکیبات فلی گیاهان می‌توانند به عنوان آنتی اکسیدانی قوی عمل کرده و جلوی فعالیت تخریبی فاکتورهای اکسیدانی را بگیرند. گزارش شده است که عصاره برگ زیتون دارای ترکیبات عمدی پلی فنلی (مثل اوکلوروپین، تیروزول و کافئیک اسید) می‌باشد که می‌توانند با زدودن مواد اکسیدان و تقویت سیستم آنتی اکسیدانی ذاتی سلول‌ها جلوی تخریب نورونی و آپوپتوز سلولی را بگیرند [۱]. یکی دیگر از

References

- [1] Al-Azzawie HF, Alhamdani MS, Hypoglycemic and antioxidant effect of Oleuropein in alloxan-diabetic rabbits. *Life Sci* 78 (2006) 1371-1377.
- [2] Boulton AJ, Vinik AI, Arezzo JC, Bril V, Feldman EL, Freeman R, Diabetic neuropathies: a statement by the

American Diabetes Association. *Diabetes Care* 28 (2005) 956-962.

- [3] Brownlee M, Biochemistry and molecular cell biology of diabetic complications. *Nature* 414 (2001) 813-820.
- [4] Cartmell SM, Gelgor LM, A revised rotarod procedure for measuring the effect of antinociceptive drugs on motor function in the rat. *J Pharmacol Methods* 26

- (1991) 149-59.
- [5] Edwards LJ, Vincent MA, Hsinlin TC, Feldman LE, Diabetic neuropathy: Mechanisms to management. *Pharmacol Ther* 120 (2008) 1-34.
- [6] Eidi A, Eidi M, Darzi R, Antidiabetic effect of olea europaea l. in normal and diabetic rats. *Phytother Res* 23 (2009) 347-350.
- [7] El NS, Karakaya S, Olive tree (Olea europaea) leaves: potential beneficial effects on human healthnure. *Nutr Rev* 67 (2009) 632-638.
- [8] Esmaeili-Mahani S, Rezaeezadeh-Roukerd M, Esmaeilpour K, Abbasnejad M, Rasoulian B, Sheibani V, Kaeidi A, Hajializadeh Z, Olive (*Olea europaea L.*) leaf extract elicits antinociceptive activity, potentiates morphine analgesia and suppresses morphine hyperalgesia in rats. *J Ethnopharmacol* 132 (2010) 200-205.
- [9] Gilani AH, Khan AU, Shah AJ, Connor J, Jabeen Q, Blood pressure lowering effect of olive is mediated through calcium channel blockade. *Int J Food Sci Nutr* 56 (2005) 613-620.
- [10] Gong D, Geng C, Liping J, Jun C, Hiroyuki Y, Laifu Z, Effects of Hydroxytyrosol-20 on Carrageenan induced Acute Inflammation and Hyperalgesia in Rats. *Phytother Res* 23 (2009) 646-650.
- [11] Gonzalez M, Zarzuelo A, Gamez M. J, Utrilla M. P, Jimenez J, Osuna I, Hypoglycemic activity of olive leaf. *Planta Med* 58 (1992) 513-515.
- [12] Hajializadeh Z, Esmaeili-Mahani S, Sheibani V, Kaeidi A, Atapour M, Abbasnejad M, Changes in the gene expression of specific G-protein subunits correlate with morphine insensitivity in streptozotocin-induced diabetic rats. *Neuropeptides* 44 (2010) 299-304.
- [13] Kaeidi A, Esmaeili-Mahani S, Abbasnejad M, Sheibani V, Rasoulian B, Hajializadeh Z, Pasban-Aliabadi H, Satureja khuzestanica attenuates apoptosis in hyperglycemic PC12 cells and spinal cord of diabetic rats. *J Nat Med* in press 2012.
- [14] Kaeidi A, Esmaeili-Mahani S, Sheibani V, Abbasnejad M, Rasoulian B, Hajializadeh Z, Afrazi S, Olive (*Olea europaea L.*) leaf extract attenuates early diabetic neuropathic pain through prevention of high glucose-induced apoptosis: in vitro and in vivo studies. *J Ethnopharmacol* 136 (2011) 188-96.
- [15] Komaki E, Yamaguchi S, Maru I, Identification of anti-alpha-amylase components from olive leaf extracts. *Food Sci Technol Res* 9 (2003) 35-39.
- [16] Leinninger GM, Edwards JL, Lipshaw MJ, Feldman EL, Mechanisms of disease: mitochondria as new therapeutic targets in diabetic neuropathy. *Nat Clin Pract Neurol* 2 (2006) 620-628.
- [17] Li F, Obrosova GI, Abatan O, Tian D, Stevens MJ, Taurine replacement attenuates hyperalgesia and abnormal calcium signaling in sensory neurons of STZ-D rats. *Am J Physiol Endocrinol Metab* 288 (2005) E29-E36.
- [18] Mohagheghi F, Bigdeli M, Rasoulian B, Hashemi P, Rashidipour M, The neuroprotective effect of olive leaf extract is related to improved blood-brain barrier permeability and brain edema in rat with experimental focal cerebral ischemia. *Phytomedicine* 15 (2011) 170-175.
- [19] Obrosova IG, Drel VR, Oltman CL, Mashtalir N, Tibrewala J, Groves JT, Role of nitrosative stress in early neuropathy and vascular dysfunction in streptozotocin-diabetic rats. *Am J Physiol Endocrinol Metab* 293 (2007) 1645-1655.
- [20] Ortega RM, Importance of functional foods in the Mediterranean diet. *Public Health Nutr* 9 (2006) 1136-40.
- [21] Sato H, Genet C, Strehle A, Anti-hyperglycemic activity of a TGR5 agonist isolated from *Olea europaea*. *Biochem Biophys Res Commun* 362 (2007) 793-798.
- [22] Scheffler A, Rauwald HW, Kampa B, Mann U, Mohr FW, Dhein S, Olea europaea leaf extract exerts L-type Ca^{2+} channel antagonistic effects. *J Ethnopharmacol* 120 (2008) 233-240.
- [23] Solati J, Soleimani N, Antidiabetic effects of ethanolic extract of *Ziziphus vulgaris L.* in streptozocin-induced diabetic adult male Wistar rats. *Physiol Pharmacol* 14 (2010) 174-180.
- [24] Soni MG, Burdock GA, Christian MS, Bitler CM, Crea R, Safety assessment of aqueous olive pulp extract as an antioxidant or antimicrobial agent in foods. *Food Chem Toxicol* 44 (2006) 903-915.
- [25] Zendedel M., Keramati K, Garavand S, Effect of intracerebroventricular injection of olive leaf extract on PTZ-induced seizures in male rats. *Physiol Pharmacol* 15 (2011) 108-115.